

**Summary: The bird fauna in Vaskijärvi Natural Park, Southern Finland.**

The area of Vaskijärvi Natural Park is 11 sq kms, of which 0.7 sq kms is made up of lakes. There is more marsh than forest in the area, but exact information is lacking. The author has made investigations in the area from 1956 to 1969.

The forest is on small islets in the marsh. Censuses and the percentage of hole-nesting species are presented in Table 1.

There is no marshy area with a high density of breeding birds in the park. The densities of birds in two largest marshy areas are 41 and 20 pairs/sq km. The breeding status of six species is shown in Table 2. In 1966 there were some four pairs of Cranes in the area, but in 1969 the number of the species had diminished as a result of drainage.

The four lakes are oligotrophic and their water is dark. The Herring Gull, the Black-throated Diver and the Teal are breeding species on them.

Among the rarer breeding birds in the forests are the Red-breasted Flycatcher, which nested in 1964, and the Three-toed Woodpecker, which nested in 1968. The Great Grey Shrike has been a regular breeding species since 1951. The Raven and the Willow Grouse have almost disappeared.

The value of the natural park as a refuge for Owls is small. The Ural Owl nested there for the first time in 1969. The Tengmalm's Owl and the Barn Owl nest in the park only temporarily. 1—2 pairs of Ospreys, 1—2 pairs of Common Buzzards and 0—1 pairs of Goshawks breed in the area annually. The Peregrine nested in the area for the last time in 1959.

**Kirjallisuus**

- HAAPANEN, A. 1962. Ikimetsien linnustosta. Suomen Luonto 21:8—15.  
 — 1965. Bird fauna of the Finnish forests in relation to forest succession. I. Ann. Zool. Fenn. 2:153—196.  
 LINKOLA, M. 1966. Viimeiset erämaat. — Helsinki.  
 LINKOLA, P. 1967. Pohjantikan, *Picoides tridactylus*, pesimisestä kanahaukan, *Accipiter gentilis*, naapuruuudessa. Orn. Fenn. 44:21—24.  
 MUSTAKALLIO, P. 1966a. Pikkusieppo kotiutumassa Vaskijärven luonnonpuistoon. Suomen Luonto 25:55.  
 — 1966b. Lounais-Suomen suolinnustossa tapahtuneista muutoksista. Orn. Fenn. 43:70—76.  
 TUOMINEN, O. 1952. Isolepinkäisen poikueyläncellä. Luonnon Tutkija 56:91.

*Tekijän osoite: Kiikka.*

**Tiedonantoja**

**Sinirinta *Luscinia svecica* pesivänä Kuusamossa kesällä 1970**

HEIKKI KETOLA & TAPIO MAJAVA

5.7. iltapäivällä tapasimme yllättäen Kuusamon kirkonkylän läheisyydessä varoittelevan sinirinta ♀:n, jolla oli ruokaa suussa. Paikka oli n. 50 m Kuusamojärven rannasta. Vähän aikaa varoiteltuaan lintu lensi maahan, jolloin kuului poikasten ääntelyä. Riensimme paikalle ja löysimme pesän, jossa oli kuusi isoa poikasta. Pesä oli mättäällä, pienen kitukasvuisen kuusen alla. Biotoppi oli matalaa (3—4 m) köivua kasvavaa rantarämettä, jossa kasvoi mm.

runsaasti katajia ja pajuja. 7.7. käydessämme pesällä oli poikue maastossa. Myös kesäkuussa tehtiin muutamia sinirintahavaintoja, jopa varoittelevistakin.

**Summary: The Bluethroat nesting in Kuusamo.**

The nest of a Bluethroat was found in Kuusamo in 1970. This is the first time that a confirmed observation of a breeding Bluethroat has been made so far south.