

Havaintoja Saimaan seudun linnustosta.

PAULI BAGGE

Viime vuosina minulla on ollut kesäisin tilaisuus retkeillä Juvan ja Sulkavan pitäjien sekä Rantasaalmen pitäjään kuuluvan Tuusjärven ympäristöalueilla.

Näiden retkien aikana on kertynyt niin runsaasti havaintoaineistoa, että sen perusteella lienee luotavissa jonkinlainen yleiskuva alueen linnustosta.

Alueelle on luonteenomaista vesien runsaus. Suurimmillaan on veden prosenttinen osuus näiden pitäjien koko pinta-alasta Sulkavalla, jonka keskiosan Suur-Saimaa katkaisee. Saimaaseen kuuluu myöskin Juvan pitäjän länsiosaan kiilana pistävä Luonteriselkä. Useimmat alueen pikkujärvistä laskevat Saimaaseen. Enimmäkseen järvet ovat dystrofiaa tai oligotrofiaa, sensijaan tyypillisiä eutrofiaa järviä ei alueella tavata.

Viljelyn maan osuus maapinta-alasta on vähäinen. Avoimia soita on myöskin vähän, ehkä eniten Juvan pitäjän länsi- ja luoteisosassa. Pääosa alueesta, n. 80 %, on metsän peitossa. Mänty on pääpuulaji, mutta koivua esiintyy paikoin erittäin runsaasti vielä vuosisadan vaihteessa suoritetun kaskeamisen ansiosta. Valoisat koivikot vaihtuvat usein hyvin jyrkästi harju- ja moreeniselänteiden juurella rinteitä peittäviin CT- tai VT-männikköihin.

Kasvillisuuden vaikutus heijastuu selvästi alueen linnustossa. Vesien karuuden vuoksi siellä tavataan varsin niukasti eteläisiä ja kaakkoisia vesilintulajeja. Alue on tässä mielessä ollut ikäänkuin tyhjiö, joka vasta viime vuosina on alkanut täyttyä: kaakosta Parikkalan ja Ruokolahden vesilintukeskuksista ja Pohjois-Savosta käsin.

Maalinnustoa ajatellen alue on vaihettumisvyöhykkeessä. Tosin on muutamien pohjoisten lajien, kuten kuukkelin ja riekon kohdalla todettavissa selvää taantumista, mutta pohjoinen aines on silti vieläkin varsin voimakkaasti edustettu.

Alueen linnustosta on olemassa verraten vähän tietoa. Ainoa sitä järjestelmällisesti käsittelevä aikaisempi julkaisu on CARL PH. LINDFORSSIN: »Sulkava sockens foglar» vuodelta 1889. Hän oli tavannut Sulkavalta 131 lajia.

Sitten Lindforssin päivien on linnuston lajikoostumus jonkinverran muttunut, kuten T. PIIPARINEN toteaa kirjoituksessaan 1957 Sulkavan

pitäjän linnustosta. Hän mainitsee toistakymmentä sellaista tulokasta, joista Lindforsilla ei vielä ollut havaintoja. Enimmäkseen nämä tulokkaat ovat eteläisiä ja kaakkoisia lajeja.

Oman mielenkiintoisen lisänsä alueen linnustoon antavat muutamamat satunnaiset harhailijat sekä Vienanmerelle alueen kautta pyrkivät merelliset lajit.

Koko alueella on tietämäni mukaan tavattu 176 lintulajia, joista n. 120 on todettu pesivinä. Alueella nykyisin säännöllisesti pesiviä lajeja on 98. Näistä edustaa pohjoista linnustoa-aineistoa noin 10 lajia ja eteläistä 55 lajia. Tilapäisesti ovat alueella viime vuosina pesineet seuraavat 10 lajia: *Falco columbarius*, *Perdix perdix*, *Bubo bubo*, *Lullula arborea*, *Dendrocopos leucotos*, *Hippolais icterina*, *Sylvia atricapilla*, *Luscinia luscinia*, *Carpodacus erythrinus* ja *Corvus corax*.

Seuraavassa esitän havaintoni alueella tavatuista harvinaisemmista lajeista.

Gavia stellata. Juvan Suurniemen kylässä suoalueella 1 pari 27. V. 1958. Sulkavalla ei tiedossani ole yhtään pesimäaikaista havaintoa viime vuosilta, ja PIIPARINEN toteaa sen siellä selvästi taantuneen.

Podiceps cristatus. Ihmetellä täytyy tämän melko karuissakin vesissä elävän uikkulajin harvalukuisuutta alueella. Se on pesinyt kerran 1940-luvulla Juvan Jukajärvässä. Sulkavalla olen tavannut lajia vain kahdesti muuttoaikaan keväällä.

Podiceps griseigena. J. Tiussan ilmoituksen mukaan laji on yleisin uikkulintu Imatran ja Rautjärven seuduilla. Sulkavalla olen härkälintua tavannut vain kerran: 2. VI. 1958 1 pari Tiimalahdella. Rantasalmen Hakojärvässä asusti 1960 2 paria koko kesän ajan.

Anas penelope. Pesii harvalukuisena alueen kaikissa osissa. Juvalla sitä tavataan Jukajärvässä ja Kuhalamessa sekä säännöllisesti 1 pari Tuusjärvässä. Sulkavalla laskimme yo. Terho Poutasen kanssa 17. V. 1959 Lepistö- ja Tuohiston- selältä noin 15 km. matkalta 8 paria, joista ehkä vielä oli joku muuttava.

Anas acuta. Harvinainen ohimuuttaja. 17. V. 1958 1 pari Tuusjärven S-päässä Rantasalmen pitäjän puolella.

Anas clypeata. Pesii Juvan Knuutilanmäen kylässä eräässä pikkulamessa. 12. VI. 1959 siellä oli 3 paria.

Aythya fuligula. LINDFORSS mainitsee lajin olevan Sulkavalla yleinen. Ainoa havaintoni on kuitenkin elokuulta 1959, jolloin 3—5 yksilöä käsittävä parvi oleskeli Sulkavan Siikavedellä. Muuallakaan alueella tukkasotkaa tuskin tavataan nykyisin pesivinä. Rantasalmen Hakojärvässä oleskeli tosin pesimisaikaan 25. VI. 1954 3 yksilöä.

Melanitta nigra. Säännöllinen kevätmuuttaja alueella. Päämuutto tapahtuu toukokuun lopussa, mutta vielä 29. VI. 1960 tapasin 4 ♂ ja 3 ♀ käsittävän parven Rantasalmen Tuusjärvellä.

Mergus albellus. 24. II. 1956 ♀ Sulkavan Pajasalmessa. Lintu oleskeli avoimessa lossiväylässä, ja oli lossinkuljettaja Hämmäläisen mukaan tavattu siinä joulukuun puolesta välistä lähtien.

Cygnus cygnus. Myöhäistä muuttoa olen todennut v. 1951, jolloin 20. XII. oleskeli 4 yksilöä Sulkavan Siikavedellä. 2 linnuista tavattiin kuolleina sähkölinjan alla Kaartilänmäen Pitkäsalmen jäällä. Paikalle oli keräytynyt pieni parvi korpeja, jotka herkuttelivat joutsenten raadoilla. 25. XII. 1959 oli juv.-pukuinen yksilö Juvalla Rapionjoen suussa.

Aquila chrysaetos. 20. VI. 1950 1 juv.-pukuinen yksilö Sulkavan Hintsalassa.

Pandion haliaetus. On selvästi yleistynyt viime vuosina. Juvalla laji pesii Luonteriselän ja Tuusjärven ympäristöissä. Joroisissa Siilinkiven kylän alueella 1960. Sulkavan Siikavedellä olen tavannut yhden parin säännöllisesti vuodesta 1955 lähtien. Lisäksi lajia tavattiin kesällä 1960 säännöllisesti Sulkavan Lepistönselällä. 23. IV. 1960 muutti aamulla klo 6.15 1 yksilöä ja klo 7.45 kaksi yksilöä Juvan kk:n yli noin 60 metrin korkeudessa suuntaan NW.

Falco columbarius. 1959 15. V. löysimme yo. T. Poutasen kanssa ampuhaukan pesän Sulkavalta Lepistönselkään kuuluvasta Keuvasaaresta. 28. V. 1960 ♂ Sulkavan Hintsalassa, edellisestä paikasta noin 10 km. itään.

Lagopus lagopus. Tavataan vielä nykyisinkin monin paikoin suurilla suoalueilla Juvan ja Rantasalmen pitäjien rajalla sekä eräissä Puumalan saarissa. 12. VII. 1959 3 poikuetta Juvan kk:n itäpuolella Suursuolla.

Perdix perdix. 28. VI. 1960 poikue Rantasalmen Tuusmäessä Parkkolan talon heinäpellolla.

Haematopus ostralegus. Jo LINDFORSS mainitsee tavanneensa lajia Sulkavalla. Havainnot kaakkois-Suomesta osoittavat meriharakan muuttavan jokseenkin säännöllisesti, joskin harvalukuisena Saimaan kautta Vienanmerelle ja Jäämerelle. Lajia on tavattu Rantasalmella 1902 (Palménin arkisto), Parikkalassa (E. Rantalainen), Taipaalsaarella 1957 (P. Linkola) ja Rautjärvellä 1955 (J. Tiussa y.m.). 13. V. 1959 tapasimme yo. T. Poutasen kanssa 52 yksilöä käsittävän parven Sulkavan Lepistönselällä. Parvi saapui etelästä helminauhamaisessa muodostelmassa voimakkaasti äänellen. Tuuli oli lievästi koillinen, sää lämmin ja aurinkoinen. Noin klo 15—15.30 linnut levähtivät eräällä kallioluodolla Ruokoniemen länsisivulla ja jatkoivat senjälkeen matkaa koilliseen.

Crex crex. Näyttää hiukan yleistyneen viime vuosina. 1952 pesivänä Rantasalmen Tuusmäessä. 1957—58 oli 1 pari Juvan kk:ssa. 22. V. 1959 1 yksilö äänteli Juvan Kaskisissa. Se oli ainoa ruisräökkä Juvan ja Sulkavan välisen maantien varrella. Kesäkuussa 1960 1 pari Juvan Järvenpäässä ja 1 pari Ronkalassa.

Vanellus vanellus. Laji on vasta 1950-luvulla alkanut yleistyä alueella. PIIPARINEN ilmoittaa lajin pesivän Sulkavan Hasuassa. Sensijaan Sulkavan pitäjän keskiosiin laji ilmestyi vasta 1957, jolloin yo. Risto Kotilaisen kanssa tapasimme 1 parin Telalahden rannalta. 1958 sekin puuttui. Vasta kesällä 1959 oli todettavissa räjähdysmäinen leviäminen kaikkialla havaintoalueellani. Saimaan vedet olivat melko alhaalla ja paljon lieterantoja jäi paljaksi. Lisäksi tähän hyypän ekspansioon alueella lienee vaikuttanut harvinaisen lämmen toukokuun alkupuoli, jonka johdosta pesiminen pääsi hyvin alkuun. Sulkavalla tapasin hyyppiä kk:ssä 4 paria, Säviösaarella 4 paria, Ruokoniemellä 2 paria sekä Tiimalahdella

2 paria. Juvalla oli kk:n ympäristössä n. 10 paria ja Rantasalmen Tuusmäessä 3 paria.

Charadrius dubius. Lisäyksenä VOIPION kirjoitukseen ko. lajista Saimaan alueella mainittakoon muutamia viimeaikaisia havaintoja Sulkavalta.

25. VI. 1956 tapasin 5 paria ja löysin 2 pesää Sulkavan Säviösaaren itäpuoliselta hiekkasärkiltä. Lintujen ruokailupaikkana oli noin 200 metrin päässä oleva lieteranta. Mainittakoon, että samoilla särkillä pesi myös kalatiirapari jonka pesä kuitenkin veden nousun takia tuhoutui. Tällaiseen kalatiiran ja pikkutyllin yhteisiintymiseen on mm. VOPIO kiinnittänyt huomiota. 1957 samalla paikalla oli vain 1 pari sekä sieltä noin 10 km. etelään Kytösaarella 1 pari.

12—15. V. 1959 oli runsaasti muuttavia pikkutyllisiä Sulkavan pitäjän keskiosissa. Linnut esiintyivät pareittain, mutta todennäköisesti muutto vielä jatkui. 12. V. Siikaveden rannoilla 9 paria ja Säviösaarella 2 paria. Lisäksi klo 3 aamulla 4 yksilöä muutti suuntaan E Vekaransalmessa.

Pikkutyllin esiintyminen Sulkavalla näyttää kytkeytyvän pitäjän keskiosan kautta luode-kaakkosuunnassa kulkevan harjukompleksin yhteyteen. Kesällä 1960 tapaamistamme kuudesta parista vain 1 tavattiin harjurantojen ulkopuolella.

Tringa ochropus. PIIPARINEN mainitsee lajin pesineen kesällä 1952 ja 1953 Sulkavalla Vilkaharjun kupeella korpintokelmassa. 1960 tapasimme yo. Asko Liukkosen kanssa siellä myöskin 1 parin.

Tringa glareola ja *T. nebularia*. Nämä pohjoiseen linnustoainekseen kuuluvat lajit olen tavannut pesivinä Juvalla: edellistä 15. V. 1957 yhden parin Rapionjoen suusta ja valkovikloa 12. VII 1959 poikueen Juvan kk:stä Kuhalammen soistuneelta rannalta.

Calidris alpina. *Calidris*-lajien muutto näiden seutujen kautta on ilmeisesti aika heikkoa. Vanhemmassa kirjallisuudessa tosin mainitaan suosirriä tavatun sekä Sulkavalla että Rantasalmella. Ainoa havaintoni lajista: 12. V. 1959 1 yksilö Sulkavan Ruokoniemellä.

Larus argentatus. On ilmeisesti vasta laajentamassa pesimäaluettaan Suur-Saimaalla. Ainoastaan muutamia laivoja seuraavia yksilöitä olen tavannut Sulkavan Siikavedellä ja Vekaransalmessa. Muuttoaikaan toukokuun alussa 1958 oli 1 pari Rantasalmen Tuusjärvellä.

Harmaalokki on Saimaan eteläosissa melko tavallinen pesijä ja esiintyy VOIPION mukaan Joutsenossa ja Ruokolahdella aina Kutveleen kanavaa myöten.

Larus ridibundus. Ainoa pesimäpaikka alueella lienee Juvan Kuosmalassa sijaitseva Evottujärvi, jossa kesällä 1960 oli 2—3 paria. Muuttoaikaan naurulokki esiintyy joskus kymmenpäisin parvin Sulkavan Vekaransalmessa.

Columba oenas. 17. IV. 1958 1 yks. Sulkavan kk:ssä.

Bubo bubo. 8. VI. 1958 4-munainen pesä Rantasalmen Tuusmäessä Tuusjärven rantakalliolla.

Strix uralensis. 1 yksilö ammuttiin Rantasalmen Tuusmäessä 10. X. 1954.

Caprimulgus europaeus. Kehrääjän kuten pikkutyllinkin levinneisyys alueella kytkeytyy kiinteästi pitkittäisharjujen yhteyteen. Sitä tavataan harvalukuisena alueen kaikissa osissa.

Apus apus. 1959 pesi Juvan kk:ssä kirkontornissa 1 pari.

Picus canus. Sulkavalla olen lajia tavannut kahdesti keväällä maaliskuussa. Juvalla 20. III. 1958 1 yksilö kk:ssä. 15. VIII. 1959 ♀ Rantasalmen Tuusmäessä.

Dendrocopos leucotos. 30. XII. 1953 ♀ Sulkavan Hintsalassa. 3. VI. 1957 tapasimme yo. R. Kotilaisen kanssa ♂:n samassa paikassa.

Dendrocopos minor. Edellisiä selvästi runsaslukuisempi.

Lullula arborea. 29. V. 1955 1 yks. Sulkavan Hintsalassa.

Eremophila alpestris. Harvinainen muuttaja.

Riparia riparia. Yhteiskuntia Sulkavan Lohikoskella ja kahdessa hiekkahaudassa Juvan kk:ssä.

Oriolus oriolus. PIIPARINEN mainitsee lajin taantuneen Sulkavalla. Tämän taantumisen näyttää kuitenkin olleen tilapäistä laatua. Kanta näyttää jonkinverran vaihtelevan eri vuosina: 1957. vain 1 pari Sulkavan Hintsalassa. — 1958. 2—13. VI yllättävän runsaasti pitäjän keskiosissa: Hintsalassa 4 paria, Tiimalahdella 1 pari ja Sulkavan ja Säämingin pitäjän rajalla kuulumme R. Kotilaisen kanssa 4 yksilön laulavan yhtäikaa. — 1960. 20—30. V. tapasimme vain 1 laulavan yksilön Säviösaaresta.

Juvalla 9. VII. 1957 1 yks. kk:ssä; 25. V. 1958 saapui ensimmäinen yksilö Juvalle. Rantasalmen Tuusmäessä 20. VI. 1955 2 yksilöä.

Corvus frugilegus. Tavataan yleisesti keväisin, kuten naakkakin, varsinkin kirkonkylien liepeellä.

Corvus corax. 2. VI. 1960 2 yks. Juvan Paatelassa. 1958. 20. IV. löytyi pesä, jossa oli 4 poikasta, Säämingin Liistonsaaresta itärannan kalliojyrkänteeltä.

Locustella naevia. 24. VI. 1957 1 laulava yks. viljapellossa Sulkavan Ruokoniemellä.

Acrocephalus schoenobaenus. 31. V. 1960 tapasimme yo. A. Liukkosen kanssa 1 yksilön Sulkavan Myllylammella. Biotooppi viittasi pesimiseen. Lajin muutto jatkuu myöhään: 5. VI. 1957 1 yks. pienellä kallioluodolla Sulkavan Lepistönselällä. 9. VI. 1959 laulava ♂ Juvalla Juka- ja Salajärven välisellä kannaksella. Ilmeisesti kysymyksessä on pohjois-Suomen kantaa olevia yksilöitä (vrt. HILDÉN 1959).

Hippolais icterina. Kvantitatiivisen laskennan yhteydessä 3. VI. 1958 tapasimme yo. R. Kotilaisen kanssa 1 parin MT-koivikossa Sulkavan Hintsalassa.

Sylvia atricapilla. 8. VI. 1957 laulava ♂ pellon laidassa tuomitiheikössä Sulkavan Kaartilänmäellä.

Phylloscopus sibilatrix. Esiintyy, kuten PIIPARINENkin (1957) toteaa, nykyisin paikoin hyvinkin runsaslukuisena Sulkavan koivikoissa. Sulkavan Hintsalassa suoritettu kvantitatiivinen laskenta 3—10. VI. 1958 toi 4 km:n alalta 5 paria. Juvalla laji on jonkinverran harvalukuisempi.

Luscinia luscinia. 24. V. 1960 tapasimme yo. Asko Liukkosen kanssa laulavan ♂ yksilön Sulkavalla Tiittalankosken rannalla.

Turdus merula. 23. IV. 1960 ♂ yksilö puutarhassa Juvan Ronkalassa.

Anthus cervinus. 1. IX. 1960 tapasin 2 yksilöä Juvalla Rapionjoen rantaniityllä. Linnut oleskelivat maassa ja läksivät hyvin vastahakoisesti lentoon niitä lähes-tyessäni, lensivät kymmenkunta metriä ja jälleen pudottautuivat ruohikkoon.

Anthus pratensis. Pesii Sulkavalla kosteilla rantaniityillä ja luhdilla. 3. VI. 1957

1 pari Hintsalan kylässä Hepoluhdalla ja Ruokolahden rannalla. 2. VI. 1958 1 pari ja pesä löytyi Sulkavan Tiimalahdelta.

Prunella modularis. 14. V. 1959 laulava ♂ hakamaalla Sulkavan Hintsalassa. Kesällä 1960 tapasin lajia neljästä paikasta Juvalla. 7. IX. 1960 rengastin juv-pukuisen yksilön verkolla Juvan kk:ssä.

Chloris chloris. Pesii varsinkin vanhan hautausmaan kuusikoissa Juvan kk:ssä.

Carduelis cannabina. Täysin kotiutunut Juvan kk:ään. 1959 laskin Juvan kk:ssä pesivän 6 paria.

Carduelis flammea. Kesällä 1957 urpiainen oli yllättävän runsaslukuinen Itä-Suomen pitäjissä. 6. VI. tapasimme yo. Risto Kotilaisen kanssa noin kymmenen parin yhteiskunnan Sulkavan Ruokoniemellä oistuneesta OMT-metsästä Paa-lahden rannalla. Ohuista männyistä löysimme 2 pesää, joiden poikaset rengas-timme. 8. VI. tapasimme Sulkavan Hintsalassa 2 paria erään suon laidasta. Elo-kuun alkupuolella samana vuonna tapasin kierteliviä pikkuparvia joka puolella pitäjää, varsinkin kk:n ympäristössä.

Juvalla tapasin joka päivä heinäkuun alkupuolella pikkuparvia. Elokuun alussa tapasin urpiaisia myöskin Ristiinassa, Virtasalmella, Joroisissa ja Rantasal-mella.

Kesällä 1960 urpiaisia oli melko vähän. 26. V. pesä katajassa Sulkavan Säviön-saarella, 5 poikasta rengastettiin 30. V. Säämingin Tuohisaarella 29. V. 1960 1 pari soistuneessa MT-metsässä. Lähistöllä asusti toinenkin pohjoinen laji, nimit-tään järripeippo.

Carpodacus erythrinus. 30. V. 1960 lauloi ♂ Sulkavan Säviönsaarella maan-tien laidassa. Juvalla olen tavannut kerran 6. VI. 1959 laulavan ♂ yksilön. Ranta-salmen Tuusmäessä laji oleskeli 1955 ja kesäkuussa 1959.

Loxia pityopsittacus. 3—5. VI. 1957 tapasimme R. Kotilaisen kanssa 3 poikuetta Sulkavalla Lepistönselän saarissa.

Loxia leucoptera. 9. X. 1960 tapasin kaksi pikkuparvea Tuusjärven S-päässä Juvan pitäjän puolella. Parvet lensivät koillisesta laskeutuen rantapuuhin. Toi-nessa parvessa oli 4, toisessa 5 yksilöä. Lentoääni oli urpiaismainen.

Fringilla montifringilla. Pesii säännöllisesti, joskin harvalukuisena alueella. Pa-rit pesivät usein verraten lähellä toisiaan, jolloin voi puhua pikku yhteiskun-nista. Biotooppi on tavallisesti joko soistunut koivumetsä tai kuiva mäntykangas.

Emberiza hortulana. Nykyisin melko tavallinen laji peltoaukeilla kaikkien kolmen pitäjän alueella.

Emberiza rustica. 2. V. 1958 muuttava ♂ Juvan kk:ssä. Samoin 17. V. ♂ Rantasalmen Tuussaarella pellon laidassa. Kumpikin havaitsemani yksilö oleskeli maassa ja käyttäytyi varsin pelottomasti.

Emberiza schoeniclus. LINDFORSSIN maininnan mukaan laji esiintyi Sulkavalla yleisenä pensaikkaa kasvavilla niittyrannoilla. Nykyisin se kuitenkin on siellä melko harvinainen. 1960 tapasin paju-sirkkua ainoastaan Säviönsaarella 1 parin sekä Kaartilänmäellä Ruokolahden rannalla 2 paria. Juvalla laji esiintyy run-saslukuisena vain muuttoaikaan.

15: 51—81. — PIIPARINEN, T., 1957, Sulkavan linnustosta 1950—54. O.F. 34: 33—36. — VOIPIO, P., 1956 a, Über einige Neuankömmlinge, zufällige Irrgäste und andere Schwankungen in der Vogelfauna der Gegend von Taipalsaari und Gross-Saimaa. O.F. 33: 41—60. — 1956 b, Zur Verbreitungsdynamik von *Charadrius dubius Scop.* in Binnenfinnland, besonders am Saimaasee. Ann. Zool. Soc. 'Vanamo' 18, 1.

Zusammenfassung: Ornithologische Notizen aus der Gegend des Sees Suur-Saimaa (Gross-Saimaa), SO-Finnland.

Sowohl die Gewässer wie die hauptsächlich kieferndominierten Wälder des Gebietes sind recht steril, die Anbauflächen von geringem Umfang, Demgemäss weisen mehrere südliche Arten hier eine Verbreitungslücke auf, während nördliche Arten wie *Tringa glareola* und *T. nebularia* als (seltene) Brutvögel vorkommen. Andere nördliche Arten wie *Cractes infaustus* und *Lagopus lagopus* sind jedoch in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen, während der südliche Kiebitz (*Vanellus vanellus*) in den letzten 1950er Jahren eine explosionsartige Zunahme aufwies.

Tiedonantoja - Meddelanden.

1. Lintuhavaintoja Tampereen seudulta vv. 1958—60.

Ardea cinerea. 5. VIII 1958 nähtiin harmaahaikara Kangasalan Kaitaalla (J. Savolainen).

Aquila chrysaetos. 23. V 1958 lensi kotka Tampereen yli pohjoiseen (A. O. Salonen), 11. X 1959 oli yksi yksilö Kangasalan Kesolla (J. Savolainen) ja 17. IV 1960 yksilö Nokialla (P. Portin).

Haliaetus albicilla. 29. III 1960 lensi yksinäinen merikotka Nokian yli suuntaan NE, klo 10 (P. Portin).

Circus aeruginosus. 2. V 1960 tavattiin ruskosuohaukka Pirkkalassa (H. Haveri ja J. Airisto).

Circus cyaneus. 19. IV 1958 naaras sinisuohaukka Tampereen Iidesjärvellä (E. Kianta ja J. Savolainen), 19. IV 1958 yksi koiras Tampereen Lielahdessa (H. Sola), 9. V 1959 naaras yksilö Ylöjärven Hirvijärvellä (E. Kianta, J. Syrjänen ja J. Airisto), 10. X 1959 Tampereen Härmälässä (H. Haveri) ja 16. IV 1960 yksi koiras Iidesjärvellä (H. Kanerva, J. Airisto ja R. Latja).

Falco peregrinus. 27. IV 1958 oli muuttohaukka Tampereen Viinikassa (J. Airisto), 17. V 1958 yksi yksilö Iidesjärvellä (A. O. Salonen), 18. V 1958 yksi yksilö Iidesjärvellä (H. Sola ja E. Kianta), 6. IV 1959 yksilö Pyynikillä (R. Latja), 27. III 1960 yksilö Iidesjärvellä (H. Haveri) ja 30. IV 1960 yksi yksilö Pyynikillä (M. Kivi).

Porzana porzana. 9. VI 1958 tavattiin luhtahuitti Tampereen Iidesjärvellä (J. Airisto), 15. VI 1958 yksi yksilö Pirkkalan Kotolahdessa (H. Haveri), 10. V 1959 yksilö Iidesjärvellä (J. Syrjänen), 11. V 1959 yksilö Tampereen Vähäjärvellä (H. Haveri), 13. V 1959 yksilö Iidesjärvellä (R. Latja), 19. VI 1959 kaksi